

# Khi nào nên đến phòng cấp cứu (ER) để khám bệnh sởi

Theo dõi các triệu chứng nghiêm trọng — quý vị có thể cần chăm sóc cấp cứu

Bệnh sởi thường bắt đầu trước tiên với tình trạng ho, sổ mũi và đau mắt đỏ, và thường dẫn đến phát ban và sốt hơn 101 độ F. Nếu quý vị nghĩ rằng mình bị bệnh sởi, hãy tìm sự chăm sóc y tế. Các triệu chứng có thể trở xấu hơn theo thời gian, các biến chứng có thể phát triển và bệnh sởi có thể gây tử vong nếu quý vị không nhận dịch vụ chăm sóc phù hợp.

**Nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào trong này, hãy đến phòng cấp cứu ngay lập tức:**



Khó thở hoặc thở nhanh hơn bình thường



Dấu hiệu mất nước nghiêm trọng (mũi và miệng khô, đi tiểu ít hơn bình thường)



Lú lẫn, giảm độ cảnh giác, hoặc yếu sức nghiêm trọng



Đối với trẻ nhỏ, có màu xanh dương quanh vùng miệng, khóc mà không ra nước mắt, năng lượng thấp bất thường, hoặc mất cảm giác thèm ăn nghiêm trọng

**!** Yêu cầu gọi phòng cấp cứu (ER) để cho họ biết có người mắc bệnh sởi sắp đến để họ có thể gặp khám quý vị cách xa các bệnh nhân khác.



TEXAS  
Health and Human  
Services

Texas Department of State  
Health Services